

EDチェックリスト(受診者用)

1	以前、薬によって過敏症状(発疹、発赤、かゆみ、その他のアレルギー症状)をおこしたことがありますか？	□はい	□いいえ
2	心臓の病気などでニトログリセリンなどの硝酸剤(舌下錠、貼り薬、塗り薬、スプレーを含む)を使用していますか？	□はい	□いいえ
3	心血管系の病気(狭心症、心筋梗塞など)がありますか？	□はい	□いいえ
4	肝臓の病気はありますか？	□はい	□いいえ
5	低血圧あるいは高血圧といわれたことがありますか？	□はい	□いいえ
6	脳梗塞あるいは脳出血をおこしたことがありますか？	□はい	□いいえ
7	網膜色素変性症と診断されたことがありますか？	□はい	□いいえ
8	陰茎の病気(屈曲、しこりなど)がありますか？	□はい	□いいえ
9	血液の病気(鎌状赤血球性貧血、多発性骨髄腫、白血病など)ありますか？	□はい	□いいえ
10	他の勃起障害薬治療(薬、器具、手術など)を行ったことがありますか？	□はい	□いいえ
11	出血性の病気あるいは消化性潰瘍(胃潰瘍、十二指腸潰瘍)がありますか？	□はい	□いいえ
12	腎臓の病気はありますか？	□はい	□いいえ
13	他に使用中の薬がありますか？	□はい	□いいえ
14	他の診療科あるいは他の医療機関を受診する際には、ED治療薬を服用していることを申し出るか、または何らかの方法で確実に医師に伝えるようにして下さい。	□はい	□いいえ
15	ED治療薬の服用後に4時間以上勃起が続く場合は、早急に医師に連絡して下さい。	□はい	□いいえ
16	ED治療薬は、催淫剤(性欲増進を目的とした薬)ではありません。性的刺激をうけなければ勃起しません。ご理解いただけましたか？	□はい	□いいえ
17	ED治療薬の服用後は自動車や機械の運転操作には注意して下さい。	□はい	□いいえ
18	食事中あるいは食直後の服用ではED治療薬の効果が遅れて出ることがあります。ご理解いただけましたか？	□はい	□いいえ
19	ED治療薬は、性行為の約1時間前に服用し、1日1回までで、次の服用は24時間以上あけてください。	□はい	□いいえ
20	ED治療薬を他の人に譲り渡さないで下さい。	□はい	□いいえ
21	性行為には心臓に負担をかけます。無理をしない様にしてください。	□はい	□いいえ

上記の項目については、私が記入しました。

平成 年 月 日

署 名